

	VRS	Pneumocoque	Zona	COVID19	Grippe	Coqueluche	ET	Tétanos
Généralités	L'infection à VRS est responsable d'une hausse des hospitalisations et des décès chez les personnes âgées.	Le pneumocoque est la première cause de méningite et de pneumonie bactériennes .	Le zona peut donner des douleurs violentes et persistantes , impactant l' autonomie et la qualité de vie du résident.	Dans le monde, 80% des personnes décédées sont âgées de 60 ans et plus.	On estime, qu'en France, 2 000 vies/an sont sauvées chaque année chez les personnes de 65 ans et plus grâce à la vaccination.	Les personnes ayant des comorbidités ou celles âgées de 80 ans et plus , sont plus sujets aux formes graves.	En France, entre 2012 et 2021, 48 cas de tétanos ont été déclarés, tous chez des personnes non à jour de leur vaccination : 14 sont décédées.	
	Plus d'infos ici	Plus d'infos ici	Plus d'infos ici	Plus d'infos ici	Plus d'infos ici	Plus d'infos ici	Plus d'infos ici	
Pour qui ?	<ul style="list-style-type: none"> résidents ≥ 75 ans résidents ≥ 65 ans avec pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques 				Tous les résidents sont concernés			
Comment ?	<p>Une dose unique Avec le vaccin Arexvy®, le vaccin Abrysvo® ou le vaccin mRESVIA®. Ces trois vaccins ne sont pas encore remboursés dans cette indication</p> <p>La nécessité d'une dose de rappel n'a pas encore été établie à ce jour</p>	<p>Une dose unique de Prevenar20® Résident ayant reçu un schéma Prevenar13® + Pneumovax® : faire une dose de Prevenar20® si le schéma remonte à plus de 5 ans</p> <p>Résident ayant reçu un Prevenar13® OU un Pneumovax® : faire une dose de Prevenar20® si le vaccin remonte à plus de 1 an</p>	<p>Shingrix® : 2 doses espacées d'au moins 2 mois</p> <p>Si antécédent de zona ou résident déjà vacciné par Zostavax®⁽¹⁾ → 2 doses de vaccins Shingrix® espacées d'au moins 2 mois, à débuter après un délai d'au moins 1 an après le zona ou le Zostavax®</p>	<p>En EHPAD, 2 doses par an sont recommandées, espacées de 6 mois : une à l'automne et une au printemps</p> <p>Un délai minimum de 3 mois après une infection ou une précédente dose est à respecter</p>	<p>Une dose avant la période épidémique.</p> <p>Si disponible, privilégier le vaccin Haute Dose ou adjuvanté.</p> <p>Un rappel chaque année est nécessaire</p>	<p>Rappel à 25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans à 75, 85, 95 ans...</p> <p>NB : le vaccin contre la coqueluche et le vaccin contre le tétanos sont obligatoirement combinés avec le vaccin contre la diphtérie et la poliomylérite.</p>		
Quand ?	Automne (1 fois)	Dès qu'on y pense (1 fois)	Dès qu'on y pense (1 fois)	Printemps et automne (annuel)	Automne (annuel)		Dès qu'on y pense (+ rappels)	
Co-administration	Co administration possible, sur des sites différents. Une limite pratique de 4 injections le même jour est généralement admise. Pas de délai particulier à respecter entre vaccins inertes s'ils ne sont pas réalisés le même jour ⁽²⁾							
Par qui ?	Médecins, infirmiers, pharmaciens							

En cas de doute sur l'indication d'un vaccin, vacciner ! Pas de risque à vacciner « par excès »

(1) Le Zostavax® n'est plus commercialisé

(2) Un intervalle de 2 semaines est requis entre l'administration du vaccin Abrysvo® et celle du dTPCa chez la femme enceinte.



Vaccination : êtes-vous à jour ?

2025
calendrier simplifié
des vaccinations
65 ans et plus

Personnes de 65 ans et plus					
	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +
DTP-Coqueluche	1 dose	1 dose		1 dose	1 dose
Pneumocoque	1 dose				
Grippe	1 dose par an				
Covid-19	1 dose par an		2 doses par an		
Zona	2 doses (à 2 mois d'intervalle)				
VRS	1 dose pour certaines maladies chroniques		1 dose		

VRS

A l'automne, la vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus. Elle est également recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

Covid-19

Chaque automne, la vaccination contre la Covid-19 est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus. Chaque printemps, une dose additionnelle est recommandée aux personnes âgées de 80 ans et plus, aux résidents d'EHPAD et USLD, et aux personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Diphthérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP) et Coqueluche

Pour que la vaccination reste efficace, un rappel est recommandé à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans, puis tous les 10 ans.

Pneumocoque

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus car elles sont plus à risque de complications.

Zona

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

Pour en savoir plus



**VACCINATION
INFO SERVICE.FR**

Le site de référence qui répond à vos questions

